

特別講演 1

シイタケ菌糸体抽出物の有用性

鈴木 信孝

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 臨床研究開発補完代替医療学講座

シイタケは古くから東アジアで食用に用いられてきた一方で、その機能性の研究も進められてきた。1969年には、シイタケの子実体から抽出された β グルカンであるレンチナンの抗腫瘍効果が報告され、その後医薬品としての開発が進められ、抗がん剤として保険適用を受けるに至っている。またこれに引続き、シイタケの菌糸体抽出物に対する免疫調節能及び抗腫瘍効果の研究が進められるようになった。本セミナーでは下記の項目を中心に、シイタケ菌糸体抽出物の概要と有用性について解説したい。

シイタケ菌糸体抽出物とは

シイタケの菌糸を固形培地で培養後、熱水抽出した茶褐色のエキス粉末である。その成分は単一ではなく、抗酸化作用と肝臓保護作用を持つシリンガ酸・バニリン酸¹⁾や免疫調節作用のある α グルカンやアラビノキシラン²⁾などが含まれている。安全性については、変異原性試験³⁾、染色体異常試験³⁾、ラット反復投与試験⁴⁾、ヒト投与安全性試験⁵⁾が報告されており、食品成分として高い安全性が確認されている。

シイタケ菌糸体抽出物の免疫調節作用

2000年代に入り、癌免疫療法の効果が十分でない原因として、免疫抑制機構の存在や炎症が注目されるようになった。すなわち、がん患者では炎症などにより免疫抑制が進行しているため、単純に免疫機能を強化するだけでは、癌を抑制することが難しく、癌抑制のためには免疫抑制を解除することが重要であるという概念である。シイタケ菌糸体抽出物はこの免疫抑制機構を解除することにより、生体の癌に対する免疫反応を回復させることが報告されている⁶⁾⁻⁹⁾。

シイタケ菌糸体抽出物の臨床研究

シイタケ菌糸体抽出物の臨床研究は、我々も含め、複数の大学医学部が参加する研究会を中心に実施されており、これまでにがん患者を対象とした有用性が複数報告¹⁰⁾⁻¹³⁾されている。我々のグループでも乳癌術後ホルモン療法施行患者¹⁴⁾や多様な背景を持つがん患者を対象としたQOLに及ぼす影響調査を実施し、いずれもシイタケ菌糸体抽出物摂取によるQOL改善が示唆されている。当日は、これらの結果についてもあわせて報告する。

参考文献

- 1) Itoh A, Isoda K, Kondoh M et al(2009).Hepatoprotective effect of syringic acid and vanillic acid on concanavalin a-induced liver injury. *Biol Pharm Bull*, **32**, 1215-1219.
- 2) Kojima H, Akaki J, Nakajima S et al(2010).Structural analysis of glycogen-like polysaccharides having macrophage-activating activity in extracts of Lentinula edodes mycelia. *J Nat Med*, **64**, 16-23.
- 3) 吉岡康子 (2010) .シイタケ菌糸体抽出物の遺伝毒性, 急性毒性および薬物代謝酵素, シトクロム P-450 3A4 阻害作用に関する検討 *日本補完代替医療学会誌*, .
- 4) Yoshioka Y, Tamesada M, Tomi H(2010).A repeated dose 28-day oral toxicity study of extract from cultured Lentinula edodes mycelia in Wistar rats. *J Toxicol Sci*, **35**, 785-791.
- 5) 吉岡康子 (2009) .健康成人におけるシイタケ菌糸体抽出物 (L.E.M.) 配合食品過剰摂取時の安全性 *日本補完代替医療学会誌*, .
- 6) Tanaka K, Matsui Y, Ishikawa S et al(2011).Oral ingestion of Lentinula edodes mycelia extract can restore the antitumor T cell response of mice inoculated with colon-26 cells into the subserosal space of the cecum. *Oncol Rep*. 2011 Nov 11., doi, 10.3892/or.2011.15.
- 7) Tanaka K, Ishikawa S, Matsui Y et al(2011).Oral ingestion of Lentinula edodes mycelia extract inhibits B16 melanoma growth via mitigation of regulatory T cell-mediated immunosuppression. *Cancer Sci*, **102**, 516-521.
- 8) Tanaka K, Ishikawa S, Matsui Y et al(2012).Combining a peptide vaccine with oral ingestion of Lentinula edodes mycelia extract enhances anti-tumor activity in B16 melanoma-bearing mice. *Cancer Immunol Immunother.*, **Nov;61**, 2143-52.
- 9) Ishikawa S, Matsui Y, Wachi S et al(2016).Age-associated impairment of antitumor immunity in carcinoma-bearing mice and restoration by oral administration of Lentinula edodes mycelia extract. *Cancer Immunol Immunother*; **65**:961-72.
- 10) Nagashima Y, Maeda N, Yamamoto S et al(2013).Evaluation of host quality of life and immune function in breast cancer patients treated with combination of adjuvant chemotherapy and oral administration of Lentinula edodes mycelia extract. *Onco Targets Ther*, **6**, 853-859.
- 11) Yamaguchi, Y., Miyahara, E., Hihara, J.(2011).Efficacy and Safety of Orally Administered Lentinula edodes Mycelia Extract for Patients Undergoing Cancer Chemotherapy: A Pilot Study. *Am J Chin Med*, **39**, 451-459.
- 12) Okuno K, Uno K(2011).Efficacy of Orally Administered Lentinula edodes Mycelia Extract for Advanced Gastrointestinal Cancer Patients Undergoing Cancer Chemotherapy: a Pilot Study. *Asian Pac J Cancer Prev*, **12**, 1671-1674.
- 13) Tanigawa K, Ito Y, Sakai M et al(2012).[Evaluation of quality of life and immune function in cancer patients receiving combined immunotherapy and oral administration of lentinula edodes mycelia extract]. *Gan To Kagaku Ryoho*, **39**, 1779-1781.
- 14) Suzuki N, Takimoto Y, Suzuki R et al(2013).Efficacy of Oral Administration of Lentinula eododes Mycelia Extract for Breast Cancer Patients Undergoing Postoperative Hormone Therapy. *Asian Pac J Cancer Prev*, **14**, 3469-3472.

共催：小林製薬株式会社