

シイタケ菌糸体抽出物とその有用性

Efficacy of the extract of Lentinula Edodes Mycelia (LEM)

鈴木信孝

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科臨床研究開発補完代替医療学講座

シイタケは古くから東アジアで食用に用いられてきた一方で、その機能性の研究も進められてきた。とくに、シイタケの子実体から抽出されたβグルカンであるレンチナンの抗腫瘍効果が報告され、その後医薬品としての開発が進められ、抗癌剤として保険適用を受けるに至っている。またこれに引続き、シイタケの菌糸体抽出物に対する免疫調節能及び抗腫瘍効果の研究が進められるようになった。本講演では下記の項目を中心に、シイタケ菌糸体抽出物の概要と有用性について臨床研究成績を中心に解説する。

シイタケ菌糸体抽出物とは

シイタケの菌糸を固形培地で培養後、熱水抽出した茶褐色のエキス粉末である（図1）。その成分は単一ではなく、抗酸化作用と肝臓保護作用を持つシリリング酸・バニリン酸¹⁾や免疫調節作用のあるα

グルカンやアラビノキシラン²⁾などが含まれている。安全性については、変異原性試験³⁾、染色体異常試験³⁾、ラット反復投与試験⁴⁾、ヒト投与安全性試験⁵⁾が報告されており、食品成分として高い安全性が確認されている。

シイタケ菌糸体抽出物の免疫調節作用

2000年代に入り、癌免疫療法の効果が十分でない原因として、制御性T細胞（Treg）を中心とする免疫抑制機構の存在が注目されるようになった。すなわち、癌患者では免疫抑制が進行しているため、単純に免疫機能を強化するだけでは、癌を抑制することが難しく、癌抑制のためには免疫抑制を解除することが重要であるという概念である。シイタケ菌糸体抽出物はこの免疫抑制機構を解除することにより、生体の癌に対する免疫反応を回復させることが報告されている⁶⁻⁸⁾。




図1 シイタケ菌糸体抽出物ができるまで

NO.	対象	方法	結果	引用
1	消化器癌化学療法施行患者	1コース：化学療法 2コース：化学療法+シイタケ菌糸体エキス	Weaken side effects of chemotherapy	Okuno K. Asian Pac J Cancer Prev:12(7) 1671-1674. 2011
2	消化器癌化学療法施行患者	1コース：化学療法 2コース：化学療法+シイタケ菌糸体エキス	QOL↑, Natural killer cell activity, Immunosuppressive acid protein↓	Yamaguchi Y. Am J Chin Med: 39 451-459. 2011
3	免疫療法施行者	1コース：免疫細胞療法 2コース：免疫細胞療法+シイタケ菌糸体エキス	QOL↑, IFNγ↑, Treg ↓	Tanigawa K. Altern Ther Health Med. 22:36-42. 2016
4	悪性腫瘍治療後の経過観察者	担子菌製剤摂取 シイタケ菌糸体、冬虫夏草、メシマコブ、靈芝	IFNγ↑, IL-10↓, Treg↓	癌免疫外科研究会 2014 (unpublished data)
5	乳がんホルモン療法施行患者	1コース：ホルモン療法 2コース：ホルモン療法+シイタケ菌糸体エキス	QOL↑, IFNγ↑	Suzuki N. Asian Pac J Cancer Prev:14(6) 3469-72. 2013
6	乳がん術後補助化学療法施行患者	1コース：化学療法 2コース：化学療法+シイタケ菌糸体エキス	QOL↑, Natural killer cell activity ↑, WBC↑	Nagashima Y. Onco Targets Ther: 853-9. 2013
7	乳がん術後補助化学療法施行患者	ダブルブラインド 化学療法 + シイタケ菌糸体エキス vs 化学療法 + プラセボ錠	QOL↑	癌免疫外科研究会 2015 (unpublished data)
8	様々な背景を有するがん患者	シイタケ菌糸体エキス4週間摂取	QOL↑ (特に進行ステージQOL↑)	日本補完代替医療学会誌 (in press)

図2 臨床研究実績
様々な治療背景・がん種で、QOL・免疫改善が報告されている

シイタケ菌糸体抽出物の臨床研究

シイタケ菌糸体抽出物の臨床研究は、我々も含め、複数の大学医学部が参加する研究会を中心に実施されており、これまでに癌患者を対象とした二重盲検試験を含め、有用性が複数報告⁹⁻¹⁴⁾されている(図2)。我々のグループでは、多様な背景を持つ癌患者を対象に4週間摂取がQOLに及ぼす影響をEORTC QOL-30調査票を用いて多施設で調査した。その結果、シイタケ菌糸体抽出物の摂取後に患者のQOL改善が示唆された。特に3、4期の患者で改善の傾向が強かった。これらの結果についてもあわせて報告する。

参考文献

- 1) Itoh A, Isoda K, Kondoh M, et al (2009). Hepatoprotective effect of syringic acid and vanillic acid on concanavalin a-induced liver injury. *Biol Pharm Bull*, **32**, 1215-1219.
- 2) Kojima H, Akaki J, Nakajima S, et al (2010). Structural analysis of glycogen-like polysaccharides having macrophage-activating activi-

ty in extracts of *Lentinula edodes* mycelia. *J Nat Med*, **64**, 16-23.

- 3) 吉岡康子, 松井保公, 小林正和ら (2010). シイタケ菌糸体抽出物の遺伝毒性、急性毒性および薬物代謝酵素、シトクロム P-450 3A4 阻害作用に関する検討. *日本補完代替医療学会誌*, **7**, 51-57.
- 4) Yoshioka Y, Tamesada M, Tomi H (2010). A repeated dose 28-day oral toxicity study of extract from cultured *Lentinula edodes* mycelia in Wistar rats. *J Toxicol Sci*, **35**, 785-791.
- 5) 吉岡康子, 為定誠, 永山在明 (2009). 健康成人におけるシイタケ菌糸体抽出物 (L.E.M.) 配合食品過剰摂取時の安全性. *日本補完代替医療学会誌*, **6**, 9-15.
- 6) Tanaka K, Matsui Y, Ishikawa S, et al (2011). Oral ingestion of *Lentinula edodes* mycelia extract can restore the antitumor T cell response of mice inoculated with colon-26 cells into the subserosal space of the cecum. *Oncol Rep*, 2011 Nov 11, doi, 10.3892/or.2011.15.

- 7) Tanaka K, Ishikawa S, Matsui Y, et al (2011). Oral ingestion of *Lentinula edodes* mycelia extract inhibits B16 melanoma growth via mitigation of regulatory T cell-mediated immunosuppression. *Cancer Sci*, **102**, 516-521.
- 8) Tanaka K, Ishikawa S, Matsui Y, et al (2012). Combining a peptide vaccine with oral ingestion of *Lentinula edodes* mycelia extract enhances anti-tumor activity in B16 melanoma-bearing mice. *Cancer Immunol Immunother*, **Nov**;61, 2143-2152.
- 9) Nagashima Y, Maeda N, Yamamoto S, et al (2013). Evaluation of host quality of life and immune function in breast cancer patients treated with combination of adjuvant chemotherapy and oral administration of *Lentinula edodes* mycelia extract. *Onco Targets Ther*, **6**, 853-859.
- 10) Yamaguchi Y, Miyahara E, Hihara J (2011). Efficacy and Safety of Orally Administered *Lentinula edodes* Mycelia Extract for Patients Undergoing Cancer Chemotherapy: A Pilot Study. *Am J Chin Med*, **39**, 451-459.
- 11) Okuno K, Uno K (2011). Efficacy of Orally Administered *Lentinula edodes* Mycelia Extract for Advanced Gastrointestinal Cancer Patients Undergoing Cancer Chemotherapy: a Pilot Study. *Asian Pac J Cancer Prev*, **12**, 1671-1674.
- 12) Tanigawa K, Ito Y, Sakai M, et al (2012). Evaluation of quality of life and immune function in cancer patients receiving combined immunotherapy and oral administration of *lentinula edodes* mycelia extract. *Gan To Kagaku Ryoho*, **39**, 1779-1781.
- 13) Suzuki N, Takimoto Y, Suzuki R, et al (2013). Efficacy of Oral Administration of *Lentinula edodes* Mycelia Extract for Breast Cancer Patients Undergoing Postoperative Hormone Therapy. *Asian Pac J Cancer Prev*, **14**, 3469-3472.
- 14) Nagashima Y, Yoshino S, Yamamoto S, et al (2017). *Lentinula edodes* mycelia extract plus adjuvant chemotherapy for breast cancer patients: Results of a randomized study on host quality of life and immune function improvement. *Mol Clin Oncol*. **3**, 359-366.